令和３年産　赤とんぼ米コシヒカリ　栽　培　暦

（３月２０日　播　種）
（４月２５日　田植え）

北九州普及指導センター
ＪＡ北九

令和３年１月２１日作成

月別	3		4			5			6			7			8	
旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬

水管理

浅　水　→　間断かん水　→　中　干　し　→　間断かん水　→　湛水　→　間断かん水　→　落水

生育ステージ

播　種　：一箱当たり１５０ｇ播き
移　植　：５０～６０株植え　株当たり３～４本植え　坪当たり
B栽培選択除草剤
B補正除草剤
B選択殺虫

50日　40日　30日　20日　10日　0日
出穂までの日数
有効分げつ終期
穂首分化期
幼穂形成期
出穂期　7/15頃
穂揃期
刈　取　：成熟期　8/19～22頃

管理のポイント

- アゾミンの投入　40kg　又は　堆肥投入　2t
- 土壌改良材の散布
- ○土づくり
- ○収穫後早めの耕起
- ○落水はなるべく遅く
- 穂肥　きたきゅう水稲用追肥　幼穂3mm　30kg
- 15～20本で早めの中干しの実施を！！
- ※中干し
- 良食味対策にけい酸加里　20kg
- 溝切り（小ヒビ）
- 予備干し（小ヒビ）
- 早めに間断潅水
- 移植　深植防止
- 基肥
  - ベスト４４４　30kg（側条の場合）25kg
  - コシヒカリ専用（破爆００５号）　30kg
  - 苦土入複合２４２　30kg
- 良食味対策にけい酸加里　40kg
- りん酸・苦土の補給にリンスター３０　30kg
- 丈夫な稲作に
- 補植苗の除去
- 又は

病害虫

- ムレ苗
- 苗立枯病
- シンガレセンチュウ
- ごま葉枯れ病
- いもち
- ばか苗病
- 雑草
- 葉いもち
- カメムシ
- カメムシ・ウンカ
- 紋枯病
- 枝梗いもち
- 穂首いもち

防除農薬

育苗管理参照

- Ａ・Ｂ共通　種子消毒　：温湯消毒（注）
- 赤とんぼＡ　：農薬不散布
- 赤とんぼＢ　：減農薬栽培（４成分以内）

	B栽培選択除草剤			A栽培除草	タニシ対策ＡＢ共通	B栽培補正除草剤						B栽培選択殺虫剤		
						広葉		イネ科		両方				
	ガンガン１kg粒剤	ガンガン豆つぶ２５０	ガンガンジャンボ	除草機ジャンボタニシ	スクミンベイト３	バサグラン粒剤	バサグラン液剤	クリンチャー１kg粒剤	クリンチャーＥＷ	ワイドアタックＳＣ	アトトリ豆つぶ２５０	トレボンＥＷ	トレボン粉剤ＤＬ	
※減農薬成分数	②	②	②		⓪	①	①	①	①	①	①		①	①

- 高温多雨時に注意
- 畦畔の見回りを行う
- 畦畔雑草の草刈
- ※出穂後の畦畔除草はしない

《防除注意点》

☆稲の開花期防除については、ミツバチへの影響が考えられますので、散布時期にご注意願います。
☆散布時期
　B栽培の方は、カメムシ防除の際トレボンを、穂揃いより１０日後頃散布

※開花直前から開花後２週間は、ミツバチへの影響回避の為、農薬散布をしない！

農薬散布時はドリフトに注意する！