

令和4年産 赤とんぼ米コシヒカリ

(3月20日 播種)
(4月25日 田植え)

栽培 暦

北九州普及指導センター
J A 北 九

令和4年1月20日作成

| 月別 | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | |
|---------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 |
| 水管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生育ステージ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理のポイント | <p> 基肥 (側条の場合) 苦土入複合 242kg バスト444 30~35kg 25kg 30kg </p> <p> 良食味対策に りん酸・苦土の補給に 30kg リンスター30 30kg けい酸加里 40kg </p> <p> 穂肥 きたきゆう 水稲用追肥 30kg 幼穂3mm </p> <p> アヅミンの投入 40kg 又は 堆肥投入 2t 土壌改良材の散布 </p> <p> 雑草対策 溝切り 予備干し(小ヒビ) 良食味対策に けい酸加里 20kg ※中干し 15~20本で早めの中干しの実施を!! 早めに間断灌水 補植苗の除去 </p> <p> 病害虫 ムレ苗 苗立枯病 シンガレセンチュウ ごま葉枯れ病 いもち ばか苗病 雑草 葉いもち カメムシ カメムシ・ウンカ 紋枯病 枝梗いもち 穂首いもち </p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防除農薬 | <p>育苗管理参照</p> <p> A・B共通 種子消毒 : 温湯消毒 (注) 赤とんぼA : 農薬不散布 赤とんぼB : 減農薬栽培 (4成分以内) </p> <p> 除草機 ジャンボタニシ ガンガン豆つば 250 ガンガンジャンボ ガンガン1キロ粒剤 </p> <p> タニシ対策 AB共通 スクミンバイト3 </p> <p> B栽培 補正除草剤 広葉 両方 バサグラン粒剤 クリンチャーE W クリンチャーE W ワイドアタックSC アトリ豆つば250 </p> <p> B栽培 選択殺虫剤 トレボンEW トレボン粉剤DL ※出穂後の 畦畔除草はしない 畦畔の見回りを 畦畔雑草の草刈 </p> <p> 防除注意点 ☆稲の開花期防除については、ミツバチへの影響が考えられますので、散布時期にご注意願います。 ☆散布時期 B栽培の方は、カメムシ防除の際トレボンを、穂揃いより10日後頃散布 ※開花直前から開花後2週間は、ミツバチへの影響回避の為、農薬散布をしない! 農薬散布時はドリフトに注意する! </p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>※減農薬成分数</p> | | | | | | | | | | | | | | | |