

# 令和4年産 夢つくし

(5月13日 播種)  
(6月5日 移植)

## 栽培 暦

北九州普及指導センター  
J A 北 九

月別	5			6			7			8			9		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
水管理															
生育ステージ及び薬剤使用時期															
管理のポイント	<p>丈夫な稲作に</p> <p>良食味対策に けい酸加里 40 kg</p> <p>基肥 バスト444 30 kg</p> <p>移植 深植防止</p> <p>補植苗の除去</p> <p>中干し 溝切り</p> <p>良食味対策に けい酸加里 20 kg</p> <p>穂肥 きたきゆう 水稲用追肥 幼穂 3 mm 30 kg</p> <p>最も水が必要な時期</p> <p>アツミンの投入 40 kg 又は 堆肥投入 2 t 土壌改良材の散布</p> <p>○土づくり</p> <p>○収穫後早めの耕起 (ヒメトビウんカ対策)</p> <p>○落水はなるべく遅く</p>														
病害虫	<p>ばか苗病</p> <p>いもち病</p> <p>ごま葉枯れ病</p> <p>シンガレセンチュウ</p> <p>苗立枯病</p> <p>白カビ</p> <p>イネミズゾウムシ</p> <p>葉いもち・ウンカ</p> <p>スクミリンゴカイ (ジャンボタニシ)</p> <p>葉いもち</p> <p>ウンカ類</p> <p>縞葉枯病</p> <p>コブノメイガ</p> <p>ウンカ類</p> <p>穂首いもち</p> <p>紋枯病</p> <p>カメムシ類</p> <p>ウンカ類</p> <p>《栽培注意点》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☆ 夢つくしはいもち病に弱いので、いもち病の常発地や野菜後等での栽培は避ける。</li> <li>☆ 早植は、高温障害により品質低下となるので避ける。</li> <li>☆ 倒れやすい傾向にあるので、過剰施肥にならないよう注意する。</li> </ul>														
重点防除農薬	<p>箱剤</p> <p>初中期一発除草剤</p> <p>必須①</p> <p>必須②</p> <p>育苗管理参照</p> <p>フルスロツトル箱粒剤</p> <p>防人箱粒剤</p> <p>サラブレッドKAIジャンボ</p> <p>ウイニングランジャンボ</p> <p>サラブレッドKAIフロアブル</p> <p>ガンガン1キログラム</p> <p>アピログロウMX1キログラム</p> <p>※移植後落水・田面の均一化</p> <p>※発生が確認された場合は防除</p> <p>※発生が無いか圃場確認</p> <p>※野菜後や高温多雨時は注意</p> <p>※昨年縞葉枯病の発生圃場はご注意願います</p> <p>補正①</p> <p>補正②</p> <p>必須①</p> <p>必須②</p> <p>いもち剤</p> <p>ウンカ剤</p> <p>エクスード粉剤DL</p> <p>エクシード粉剤DL</p> <p>ゴウケツモンスター粒剤</p> <p>ダブルカットバリダフロアブル</p> <p>トレボンEW</p> <p>ブラシントレバリダ粉剤DL</p> <p>カメムシ剤</p> <p>アルバリン顆粒水溶剤</p> <p>アルバリン粉剤DL</p> <p>スタークル豆つが</p> <p>※出穂後の畦畔除草はしない</p> <p>《防除注意点》</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☆ 稲の開花期防除については、ミツバチの影響が考えられますので、開花直前から開花後2週間は農薬の散布を避けましょう。</li> <li>☆ 散布時期 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 必須①は、出穂前散布</li> <li>・ 必須②は、穂揃い期から10日後を目安に散布</li> <li>・ 補正①・②については発生時や多発が予想される際に散布。</li> </ul> </li> <li>※ 農薬散布時のドリフトに注意！！</li> </ul>														
※減農薬成分数	③④			④②③③③			②②①①①			③①①③			①①①		

※減・減栽培夢つくしについては、別途、栽培基準作成