

令和5年産 赤とんぼ米コシヒカリ

(3月20日 播種)
(4月25日 田植え)

栽培 暦

北九州普及指導センター
J A 北 九

令和4年12月19日作成

月別	3		4			5			6			7			8												
旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬											
水管理																											
生育ステージ	播種 1箱当たり 播き 150g		移植 50坪当たり 株当たり3本植え 株当たり4本植え			B栽培選択除草剤			50日 有効分げつ終期			40日 出穂までの日数			30日 穂首分化期			20日 幼穂形成期			10日 出穂			0日 7/15頃 穂揃期		刈取 成熟期 8/19~22頃	
管理のポイント	丈夫な稲作に リンスター30kg		良食味対策に けい酸加里 40kg			基肥 (側条の場合) バスト444 30~35kg 苦土入複合 25kg 242 30kg			移植 深植防止 溝切り			※中干し 15~20本で 早めの中干しの 実施を!!			穂肥 きたきゆう 水稲用追肥 30kg 幼穂3mm			アヅミンの投入 40kg 又は 堆肥投入 2t 土壌改良材の散布			○土づくり ○収穫後早めの耕起 ○落水はなるべく遅く						
病害虫	ばか苗病 いもち ごま葉枯れ病 シンガレセンチュウ		ムレ苗 苗立枯病			雑草			葉いもち			カメムシ カメムシ・ウンカ 紋枯病 枝梗いもち 穂首いもち															
防除農薬	育苗管理参照		B栽培 選択除草剤			A栽培 除草			タニシ対策 AB共通			B栽培 補正除草剤			B栽培 選択殺虫剤			《防除注意点》 ☆稲の開花期防除については、ミツバチへの影響が考えられますので、散布時期にご注意願います。 ☆散布時期 B栽培の方は、カメムシ防除の際トレレボンを、穂揃いより10日後頃散布 ※開花直前から開花後2週間は、ミツバチへの影響回避の為、農薬散布をしない! 農薬散布時はドリフトに注意する!		※減農薬成分数							
	A・B共通 種子消毒 : 温湯消毒(注)		ガンガン1キロ粒剤			ガンガン豆つぶ250			スクミンバイト3			バサグラン液剤			トレレボネEW トレレボン粉剤DL			① ①									
	赤とんぼA : 農薬不散布		ガンガン1キロ粒剤			ガンガン豆つぶ250			スクミンバイト3			バサグラン液剤			トレレボネEW トレレボン粉剤DL			① ①									
	赤とんぼB : 減農薬栽培 (4成分以内)		ガンガン1キロ粒剤			ガンガン豆つぶ250			スクミンバイト3			バサグラン液剤			トレレボネEW トレレボン粉剤DL			① ①									