

令和5年産 夢つくし

(5月13～18日 播種) 栽培 暦
(6月5～10日頃 田植え)

北九州普及指導センター
J A 北 九

月別	5月		6月			7月			8月			9月		
旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
水管理														
生育ステージ	5月13～18日頃 播種 一箱当り 150g 6月5～10日頃 田植 坪当り 60株 3畝 4本 植え -35日 -30日 -25日 -20日 -10日 0 有効分けつ終期 穂首分化期 幼穂形成期 8/12頃 出穂期 穂揃期 刈取 成熟期 9/16日頃													
管理のポイント	良食味対策に けい酸加里 40kg 基肥 ベスト 444 35kg 田植 深植防止 除草剤施用 補植苗の除去 中干し 溝切り 良食味対策に けい酸加里 20kg 穂肥 NK2号 幼穂 3mm 15kg 最も水が必要な時期！ アヅミンの投入 40kg 又は 堆肥投入 2t 土壌改良資材施用 ○土づくり (ヒメトビウンカ対策) ○収穫後早めの耕起 ○落水はなるべく遅く													
病害虫	《栽培注意点》 ☆ 夢つくしはいもち病に弱いので、いもち病の常発地や野菜後等での栽培は避ける。 ☆ 早植えは、高温障害により品質低下となるので避ける。 ☆ 倒れやすい傾向にあるので、過剰施肥にならないよう注意する。													
防除農薬	育苗管理参照 箱剤 防人箱粒剤 初中期一発除草剤 ウイニングランジャンボ ※移植後落水・田面の均一化 ※病斑が確認された場合は防除 ※発生が無いか圃場確認 ※野菜後や高温多雨時は注意 ※昨年縞葉枯病の発生した圃場は、ご注意ください 必須① 必須② 《防除注意点》 ☆ 稲の開花期防除については、ミツバチへの影響が考えられますので、散布時期にご注意願います。 ☆ 散布時期 必須①は、出穂前散布 必須②は、穂揃い後期散布 ※ 開花期直前～開花後2週間は、ミツバチへの影響回避の為、農薬散布をしない！ 農薬散布時はドリフトに注意する！													
※ 農薬成分数	④	③		④	②	②	③	③	③			①	①	①

※減・減栽培夢つくしについては、別途、栽培基準作成