

水稻中後期管理情報 病虫害防除資材一覧

	対象病害虫	剤型	農薬名	使用量/10a (希釈倍数)	使用時期 (推奨される時期)	収穫前日数等 (農業登録上の期限)	備考	使用 回数
基幹防除① 出穂前防除	いもち病、カメムシ類、 ウンカ類、紋枯病	粉剤	ブラシントレバリダ粉剤DL	4kg	出穂直前	14日	いもち病、ウンカ類、 紋枯病は3~4kg/10aで登録	2回
	いもち病、紋枯病	液剤	ダブルカットバリアフロアブル	1000倍	出穂直前	穂揃い期まで	水量 60~200L/10a	2回
	ウンカ類、カメムシ類		エクシードフロアブル	2000倍		7日	水量 60~150L/10a	3回
	いもち病、カメムシ類、 ウンカ類、紋枯病	粒剤	ゴウケツモンスター 粒剤	3kg	出穂20日~5日前まで に散布	出穂5日前まで 但し収穫45日前まで	水を溜めて散布	1回
基幹防除② 出穂14日後頃	ウンカ類、カメムシ類	粉剤	アルバリン粉剤DL	3kg	出穂14日後頃	7日		3回
		液剤	アルバリン顆粒水溶剤	2000倍	出穂14日後頃	7日	ウンカ類は3000倍 で登録 水量60~ 150L/10a	3回
		粒剤	アルバリン粒剤	3kg	出穂14日後頃	7日	水を溜めて散布	3回
補正防除	いもち病	粉剤	ノンプラス粉剤DL	3~4kg	—	7日		2回
		液剤	ノンプラスフロアブル	1000倍	—	7日	水量 60~150L/10a	2回
		粒剤	コラトップジャンボP	10~13パック	—	葉いもち：初発20日前 から初発時 穂いもち：出穂30~5日前	水を溜めて散布	2回
	紋枯病	液剤	バリダシン液剤5	1000倍	—	14日	水量 60~150L/10a	5回
	ウンカ類、カメムシ類	粉剤	アルバリン粉剤DL	3kg	—	7日		3回
		液剤	アルバリン顆粒水溶剤	2000倍	—	7日	ウンカ類は3000倍 で登録 水量60~ 150L/10a	3回
			トレボンEW	1000倍	—	14日	水量 60~150L/10a	3回
			エクシードフロアブル	2000倍	—	7日	水量 60~150L/10a	3回
粒剤		スタークル豆つぶ	250g	—	7日	ウンカ類は250~ 500g/10aで登録 水を溜めて散布	3回	

↓最新の営農情報や
農薬の詳細はこちら!!



JA北九HP



農業登録情報
提供システムHP



福岡県病害虫
防除所HP

JA北九



・営農情報
・病害虫情報
・稲作情報、稲作ごよみ
・経済情報
などなど、ホームページなどに掲載している情報をいち早く配信いたします!

LINE 公式アカウント