

令和6年産 赤とんぼ米コシヒカリ

(3月20日 播種)
(4月25日 田植え)

栽培 暦

北九州普及指導センター
J A 北 九

令和6年1月30日作成

月別	3		4			5			6			7			8			
旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬		
水管理																		
生育ステージ	播種 1箱当たり 播き 150g		移植 50坪当たり 株当たり3本植え 株当たり4本植え			B補正除草剤			B選択殺虫			刈取 成熟期 8/18~22頃						
管理のポイント	良食味対策に りん酸・苦土の補給に リンスター30 30kg 丈夫な稲作に けい酸加里 40kg		基肥 (側条の場合) バスト444 35kg 25kg 30kg 苦土入複合 242 20kg			移植 深植防止 溝切り 予備干し(小ヒビ) ※中干し 15~20本で 早めの中干しの 実施を!! 良食味対策に けい酸加里 20kg 補植苗の除去			穂肥 きたきゆう 水稲用追肥 30kg 幼穂3mm			アヅミンの投入 40kg 又は 堆肥投入 2t 土壌改良材の散布 ○土づくり ○収穫後早めの耕起 ○落水はなるべく遅く ○イネカメムシに注意						
病害虫	シンガレセンチュウ ごま葉枯れ病 いもち ばか苗病		ムレ苗 苗立枯病			雑草 いもち病の多発ほ場 は基準より5~10kg 程度の減肥を!!			葉いもち			紋枯病 枝梗いもち 穂首いもち		カメムシ類 イネカメムシ ウンカ類				
防除農薬	育苗管理参照 A・B共通 種子消毒 : 温湯消毒(注) 赤とんぼA : 農薬不散布 赤とんぼB : 減農薬栽培 (4成分以内)		B栽培 選択除草剤 ガンガン1キョ粒剤 ガンガンジャンボ ガンガン豆つば250 ジャンボタニシ 除草機			A栽培 除草 スクミンバイト3			タニシ対策 A B共通 スクミンバイト3			B栽培 補正除草剤 広葉 バサグラン粒剤 イネ科 クリンチャーE W 両方 ワイドアタックSC アトトリ豆つば250			B栽培 選択殺虫剤 ※出穂後の 畦畔除草はしない トレボンE W トレボン粉剤DL		《防除注意点》 ☆殺虫剤散布時期(B栽培のみ) (イネカメムシ) 出穂期頃から発生の可能性があるため、 発見次第トレボンを散布 (通常のカメムシ類) 予防の場合は、トレボンを穂揃いから1 0日後頃散布 ※開花直前から開花後2週間は、ミツバ チハの影響回避の為、農薬散布をしない! 農薬散布時はドリフトに注意する!	
	※減農薬成分数		②	②	②		①	①	①	①	①		①	①				