

令和6年産減・減夢つくし

(5月13日 播種)
(6月5日 田植え)

栽培暦

北九州普及指導センター
J A 北 九

月別	4			5				6			7			8			9		
	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
水管理																			
生育ステージ																			
管理のポイント	<p>種子消毒 (温湯消毒) 60℃ 10分</p> <p>● レング・菜の花 鋤き込み</p> <p>リン酸・苦土の補給に リンスター30 30 kg</p> <p><基肥> (一発肥料) 有機エムコート256 60 kg 新スーパーユーキくん1号 40 kg または</p> <p>移植 深植防止</p> <p>● 中干し 溝切り</p> <p><追肥> スーパーユーキくん3号 35 kg</p> <p>最も水が必要な時期</p> <p>○ 土づくり (ヒメトビウンカ対策) ○ 収穫後早めの耕起 ○ 落水はなるべく遅く</p> <p>アヅミンの投入 40 kg 堆肥投入 2 t ミネラルG 200 kg</p> <p>倒伏防止・病害虫対策に、けい酸加里の使用をお勧めします。 基肥時40kg又は、中干し時20kg</p>																		
病害虫	<p>《特徴》</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ 夢つくしはいもち病に弱いので、いもち病の常発地や野菜後等での栽培は避ける。 ☆ 倒れやすい傾向にあるので、過剰施肥にならないよう注意する。 ☆ 穂発芽しにくい。 ☆ 食味が良い。 <p>ばか苗病、いもち病、ごま葉枯病、イネシンガレセンチュウ、白カビ、苗立枯病、イネミズゾウムシ、葉いもち・ウンカ、(ジヤンボタニシ) スクミリンゴガイ、葉いもち、縞葉枯病、ヒメトビウンカ、紋枯病、ウシカ類、穂首いもち、カメムシ</p>																		
防除農薬	<p>● 種子消毒 温湯消毒</p> <p>種子消毒: ベンレート水和剤 ※浸漬後しっかりと風乾させる ※少量の水でのり状に練り、規定水量と混合</p> <p>箱剤: 防人箱粒剤</p> <p>初中期一発除草剤: ガンガン豆つぶ 250, ガンガンジャンボ, ガンガン1キロ粒剤 ※移植後落水・田面の均一化</p> <p>スクミンベイト3 ※昨年縞葉枯病の発生圃場はご注意ください ※発生が無い圃場確認 ※野菜後や高温多雨時は注意</p> <p>アトトリ豆つぶ250 ※除草剤(補正)</p> <p>必須①: 粉剤 (ダブルカットトレボン粉剤3DL), 液剤 (ダブルカットバリダフロアブル)</p> <p>必須②: カメムシ剤 (スタークル豆つぶ, アルバリン顆粒水溶剤, アルバリン粉剤DL) ※出穂後の畦畔除草はしない</p>																		
成分数	<p>① ③ ② ② ② ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①</p> <p>左の成分数の合計が10成分以下</p>																		