


令和8年産麦栽培暦



■土づくり：麦の適正 pH 6.0～6.5

土づくりのフローチャート例		(10aあたり)
土壌診断	酸度矯正	①ミネラルGの散布(140～200kg)
		②石灰資材の散布(100～180kg)
	地力維持	①稲わらの全量すき込み
		②堆肥・鶏糞の散布(1～2t)

※大麦は特に酸性障害が発生しやすいので注意しましょう

■排水対策(重要)

- ①弾丸暗渠・周囲溝の設置・排水溝の整備
- ②土入れによって畝溝を作り、周囲溝と排水溝を確実につなぐ
- ③確実な排水のために枕地を切る。
- ④雨水の停滞を防ぐために、定期的に溝さらいを行う。

■播種時期と播種量

		適 期	(10aあたり)
品種名	11月10～19日	11月20～31日	12月1～10日
はるか二条		6～8kg	8～10kg
チクゴイズミ			8～9kg

※早播は品質低下・凍霜害の原因となるので、適期播種を心がけましょう
※目標出芽本数:100～150本/m²

■施肥基準

分 施				
品 種 名	基 肥	分 げ つ 肥	穂 肥	穂 揃 い 期 追 肥
		1月下旬～2月上旬	3月上旬	4月中下旬
はるか二条	ベスト444 45kg ※大豆後作の場合 は20kg	ベスト444 25～30kg or NK2号 20～25kg	ベスト444 20kg or NK2号 15kg	
		麦追肥名人 30～35kg		
チクゴイズミ		ベスト444 25kg or NK2号 20kg	ベスト444 20kg or NK2号 15kg	硫安 10kg or 尿素 5kg
		グッドIB407号 30kg		
一発肥料				
品 種 名	基 肥	分 げ つ 肥	穂 肥	穂 揃 い 期 追 肥
		1月下旬～2月上旬	3月上旬	4月中下旬
はるか二条	※麦忍者(36-3-3) 35kg			
チクゴイズミ				硫安 10kg or 尿素 5kg

※「麦忍者」はリン・カリ成分が各3%ずつとなっており、単年での栽培では問題ありませんが、複数年続けて栽培を行うとリン・カリ成分の不足による生育不良を招くおそれがあります。
そのため、複数年での使用を行う場合はリン・カリ成分を含む肥料や土壌改良材をあわせて使用してください。

■麦踏み・土入れ

【麦踏み】 効果:分げつの促進・倒伏防止など

※12月下旬(本葉が3～4枚)～2月中旬(節間伸長開始前)までに2～3回実施
※必ず、土壌が乾いている状態で行う

【土入れ】 効果:倒伏防止・雑草防除・肥効上昇(施肥後)など			
時期	1月上～中旬	2月上～中旬	2月下旬～3月上旬
麦の生育	本葉3～4枚	分げつ後期	茎立ち期
土入れの程度	浅く	順次深く	順次深く

■除草剤

播種前～麦生育期		(10aあたり)			
除草剤名		薬量	希釈水量	使用時期	
播種前～ 播種後 出芽前	バスタ液剤	300～500ml	100～150ℓ	播種前又は播種後出芽前	
	ラウンドアップ マックスロード	200～500ml	50～100ℓ	耕起前又は播種前まで、 播種後出芽前	
播種直後 ～ 麦生育期	リベレーター フロアブル	60～80ml ※大麦は 60～70ml推奨	100ℓ	播種後～麦3葉期 (イネ科雑草1葉期まで)	
	ボクサー	400～500ml	70～100ℓ	播種後～大麦2葉期 小麦4葉期まで	
生育期		(10aあたり)			
除草剤名	適用雑草	薬量	希釈 水量	使用時期	備考
ハーモニーDF	1年生広葉雑草 スズメノテッポウ	5～10g	50～ 100ℓ	播種後～節間伸長前	カズノコサ(3葉期ま で)には1葉期～節間 伸長前に10g散布
バサグラン液剤	1年生広葉雑草	100～ 200ml	70～ 100ℓ	雑草3～6葉期 (小麦収穫45日前まで 大麦収穫90日前まで)	トゲミノキツノボタン(ウマ ゼリ)に効果が高い
MCPソーダ塩	広葉雑草	200g	70～ 100ℓ	幼穂形成期 (収穫45日前まで)	カラスノエンドウ・ウマ ゼリに効果が高い

※MCPソーダ塩は使用時期に注意。
(気温が低すぎると効果が薄れますが、散布が遅すぎると薬害を生じる場合があります。2月下旬～3月中旬が使用推奨の目安時期。)
※ハーモニーDF・MCPソーダ塩を使用した後は、消石灰等を用いてタンクの洗浄を行ってください。

■病虫害対策

種子消毒

対象病害虫	農薬名	処理方法	使用量
ヤギシロトビムシ(小麦)	クルーザーFS30	塗沫処理	種子1kg当たり原液6ml
網斑病(大麦)黒穂病	トリフミン水和剤	種子重量0.5%の種子粉衣	種子10kgに50g

赤かび病

薬剤名	薬量	希釈水量	散布適期	散布期限
ワークアップ粉剤DL	3kg	150ℓ	小麦:開花期とその7～10日後 大麦:穂揃い期10日後とその7～10日後	収穫7日前まで
ワークアップフロアブル	50～75ml			
ミラビスフロアブル	75～100ml			大麦:収穫14日前まで 小麦:収穫7日前まで

黄斑病(小麦)

薬剤名	薬量	希釈水量	散布適期	散布期限
チルト乳剤25	150ml	150ℓ	3月下旬～出穂前	収穫3日前まで